


## Степен блатар *Circus macrourus*

### Визуално проучване на дневната миграция

#### Численост и фронт на миграцията през Южна България и Добруджа

Степният блатар е относително малочислен мигрант през България. Освен това той е световно застрашен вид. По време на есенната миграция 2012 г. са установени да прелитат 85 индивида. В Южна България са отчетени 39 индивида, от които 6 – на временната наблюдателна точка на Атанасовско езеро. В Добруджа са наблюдавани 49 степни блатари. В Южна България степни блатари са наблюдавани да мигрират в най-източната част на проучвания район – между Александрово и Атанасовско езеро, и в района на Източните Родопи (Арката и Върбово) (фиг. 65А). Най-голям брой птици са отчетени при Суходол. В Добруджа степният блатар е регистриран на всички наблюдателни точки с изключение на Вранино и временните наблюдателни точки (фиг. 65Б.). Най-голям брой прелитащи степни блатари е отчетен при Гешаново, където през есента на 2011 г. не е наблюдаван нито един индивид. На наблюдателните точки Пленимир и Дуранкулак са отчетени по-голям брой степни блатари в сравнение с 2011 г.



А/ Южна България


Б/ Добруджа

Фигура 65. Фронт на миграцията на степния блатар през есента на 2012 г.

#### Интензивност и динамика на прелета на вида в периода на изследването

##### Сезонна динамика

Основната част от степните блатари са преминали над района на проучване през септември – 39 индивида. През август са преминали 13, а през октомври – 33 индивида. Най-рано степни блатари са регистрирани на наблюдателната точка Суходол (1 индивид) на 15.8.2012 г., а най-късно са наблюдавани на 31.10.2012 г. – 1 птица на наблюдателната точка в Гешаново (фиг. 66).




Фигура 66. Сезонна динамика на прелета на степния блатар през есента на 2012 г.

### Дневна динамика


На базата на наблюденията на степния блатар на 12 от наблюдателните точки може да се заключи, че най-голям брой птици прелитат изследвания район на Южна България и Добруджа в периода между 13 и 15 ч., макар че относително интензивен прелет се наблюдава и между 9 и 11 ч преди обед (фигура 67).

Независимо от времето през деня, повечето степни блатари летят на височина под 200 м. (фигура 68). Птици летящи в по-горния височинен пояс – между 200 и 500 м са наблюдавани между 9 и 17 ч. На височина над 500 м. са регистрирани единични птици между 10 и 16 ч.

Фигура 68. Връзка между дневната динамика на прелета на степния блатар и височината на полета по време на есенна миграция 2012 г.




Фигура 67. Дневна динамика на прелета на степния блатар през есента на 2012г.



### Височинно разпределение на прелитащите реещи птици

По време на есенната миграция 2012 г. в Южна България и Добруджа степните блатари са наблюдавани да прелитат на височина от 5 м до 1200 м, като най-много птици прелитат на височина между 5 и 50 м (фигура 69). На практика 10% от наблюдаваните степни блатари са прелетели на височина над 500 м, 16% - на височина между 200 и 500 м, 75% - на височина под 200 м.



Фигура 69. Височина на полета при степния блатар по време на есенната миграция 2012 г.

### Миграционни потоци

Основното направление на прелитащите степни блатари на всички наблюдателни точки, където са регистрирани, е север – юг. При Гешаново, където са регистрирани най-голям брой мигранти, и при Ветрен основното направление на прелета е на югозапад.

### Използване на района за стационаране и нощуване от реещи птици

Не са наблюдавани нощуващи птици в районите около наблюдателните точки.